

Dominerende kondisjon (ørret):

60D

(Mager / middels / god / meget god)

Dominerende kjøttfarge (ørret):

Hvit

(Hvit / lyserød / rød)

Fiskestørrelse:

Arter	Minimum Lengde (cm)	Maksimum Lengde (cm)	Gjennomsnitt Lengde (cm)
Ørret	44,0	44,0	44,0
Abbor	5,3	39,7	12,3
Gjedde	47,8	47,8	47,8
Mort	7,0	23,7	12,2
Ørekyte			

Foreløpig konklusjon:

Sagshusjøen er dominert av abbor og mort. Det er også gjedde og utsatt ørret i vabnet. Det er usikkert om naturlig rekruttering av ørret forekommer. Abbor blir fisket ut med ruser - ca 10000-12000 stk pr. år. Dette frigjør næring og bidrar til at det finnes stor abbor i vabnet.

Foreløpige resultater for registrering i LIMNOBASE:

Innsjønr.:

4280

Arter	Relativ tetthet	Trussel-grad	Trussel-faktor	Endring	Yngel-forekomst	Gyte-forhold	Gyte-sted
Ørret	4					3	
Abbor	3					4	
Gjedde	4					4	
Mort	3					4	
Ørekyte							

Utsetting av ørret:

Dato	Antall	Stamme	Stadium	Dato	Antall	Stamme	Stadium